

EL TEMPERAMENTO EN ADOLESCENTES CON PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO

Introducción

La persistencia del conducto arterioso (PCA) es una cardiopatía congénita que tiene como factores de mayor riesgo los nacimientos prematuros y la presentación del síndrome de dificultad respiratoria.

El objetivo del estudio exploratorio y comparativo fue evaluar el temperamento de los pacientes referidos de consulta externa con PCA del Instituto Nacional de Cardiología, de edades entre 12 y 16 años, y se comparó con el grupo de pacientes con comunicación interauricular CIA e interventricular CIV del mismo instituto a través del test del dibujo de la figura humana.

Materiales y método

Se evaluó una muestra de 35 pacientes. Un grupo experimental con diagnóstico de PCA (nPCA=12), y un grupo de control que tiene un diagnóstico de CIA y CIV (nCIA=17, nCIV=6; Total: nCIA/CIV=23).

A los participantes se les aplicó la prueba del dibujo de la figura humana. Para esta investigación se utilizó la interpretación de Machover, quien formuló hipótesis de orientación psicoanalítica a través de las partes corporales dibujadas y su dinámica con la personalidad del adolescente.

Se asignó un valor a la presencia o ausencia de las partes corporales y a los tamaños chico, mediano o grande de las mismas, con la finalidad de cuantificar los resultados; cada una de las partes del cuerpo significa algún rasgo de personalidad.



Patricia Martínez Lanz


Centro Anáhuac de Investigación en Psicología
pmlanz@anahuac.mx

Anais Ávila

Centro Anáhuac de Investigación en Psicología
fragola_babe@hotmail.com

Blanca P. Ríos Martínez

Centro Anáhuac de Investigación en Psicología
blanca_rios@hotmail.com



Resultados

La confiabilidad obtenida a través de la realización de un análisis de consistencia interna mediante el alfa de Cronbach fue satisfactoria (alfa de Cronbach= .778).

Con base en los resultados obtenidos, se puede observar que las diferencias entre ambas cardiopatías no son muy significativas; sin embargo, los pacientes con PCA muestran mayor estabilidad y aceptación de sí mismos, mientras que los pacientes con CIA y CIV tienden a tener más relaciones interpersonales y mayor preocupación por sus cambios sexuales, factor ligado a la etapa de crecimiento en la adolescencia.

Conclusiones

Aun cuando sus dibujos representan una buena adaptación social, estos adolescentes mostraron un pequeño porcentaje de rasgos que pueden desencadenar un cuadro depresivo. Esto es, en caso de desarrollar un cuadro de este tipo, se puede alterar la percepción de eficacia, inclinándose más a las desilusiones o imposibilidades físicas padecidas.

C50 Referencias

1. Esquivel F, Heredia C, Gómez EL. Psicodiagnóstico clínico del niño. México: Manual Moderno; 1999.
2. Hernández P, Salazar C. Cardiopatías congénitas en adolescentes y adultos, análisis de los pacientes egresados de los hospitales generales del área metropolitana, durante 1998. Acta Médica Costarricense 2001;43:128-35.
3. Portuondo JA. Test proyectivo de Karen Machover (la figura humana). España: Biblioteca Nueva; 1992.

